

SIMULAZIONE - 25 FEBBRAIO 2015 - PROBLEMA 1



1)

Il grafico della velocità in funzione del tempo è una parabola con asse di simmetria $t = 5$, vertice $V = (5; 30)$ e passante per $A = (0; 5)$. Abbiamo quindi:

$v = at^2 + bt + c$, con:

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = 5 \\ 30 = 25a + 5b + c \\ 5 = c \end{cases} \quad \begin{cases} b = -10a \\ 30 = 25a - 50a + 5 \\ 5 = c \end{cases} \quad \begin{cases} b = 10 \\ a = -1 \\ c = 5 \end{cases}$$

Quindi l'espressione della velocità in funzione del tempo è:

$$v = v(t) = -t^2 + 10t + 5 \quad (\text{con } t \text{ espresso in secondi e } v \text{ in km/s}).$$

2)

Tenendo presente che: $v = v(t) = s'(t)$ si ha:

$$s'(t) = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt} \left(-\frac{1}{3}t^3 + 5t^2 + 5t \right) = -t^2 + 10t + 5 = v(t)$$

Quindi effettivamente la funzione $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 5t^2 + 5t$ rappresenta lo spazio percorso dal meteorite in funzione del tempo.

N.B. In generale alla $v(t) = -t^2 + 10t + 5$ corrisponde la legge oraria:

$s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 5t^2 + 5t + s_0$, essendo s_0 la posizione assunta dal primo meteorite all'istante $t = 0$; porre $s_0 = 0$ equivale a dire che per $t = 0$ il meteorite si trova nell'origine degli spazi.

3)

Indicata con $s_2(t)$ la legge oraria del secondo meteorite, affinché avvenga l'urto è necessario che, detto t_{urto} l'istante in cui avviene l'urto, i due meteoriti in tale istante si trovino nella stessa posizione, cioè che:

$$s(t_{urto}) = s_2(t_{urto}) .$$

4)

Dopo l'urto il primo meteorite si muove con la nuova legge oraria:

$$s(t) = 2t^2 + \frac{5}{3}t$$

Per determinare l'istante in cui avviene l'urto è sufficiente scoprire quando il primo meteorite cambia traiettoria, cioè quando (per $t > 0$):

$$-\frac{1}{3}t^3 + 5t^2 + 5t = 2t^2 + \frac{5}{3}t \implies -t^3 + 15t^2 + 15t = 6t^2 + 5t \implies t^3 - 9t^2 - 10t = 0$$

$$\text{Da cui: } t = 0 \text{ e } t^2 - 9t - 10 = 0 : t = -1 \text{ e } t = 10 .$$

L'urto avviene quindi all'istante $t_{urto} = 10 \text{ s}$. Prima dell'urto il primo meteorite ha percorso uno spazio pari a $s = s(10) = \frac{650}{3} \cong 216.7 \text{ m}$.

5)

Si chiede di studiare la funzione di equazione:

$$s = s(t) = \begin{cases} -\frac{1}{3}t^3 + 5t^2 + 5t, & \text{se } 0 \leq t \leq 10 \\ 2t^2 + \frac{5}{3}t, & \text{se } 10 < t \leq 30 \end{cases}$$

Studiamo la funzione per $0 \leq t \leq 10$:

$$s = s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 5t^2 + 5t$$

Si tratta di una cubica, definita su tutto \mathbb{R} ; studiamola su \mathbb{R} e poi evidenziamo la parte richiesta.

Simmetrie notevoli:

$s(-t) \neq s(t)$: non è pari; $s(-t) \neq -s(t)$: non è dispari.

Ricordiamo che una cubica ha sempre uno ed un solo flesso, che è centro di simmetria per la curva.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $t = 0$, $s = 0$.

Se $s = 0$, $-\frac{1}{3}t^3 + 5t^2 + 5t = 0$, $t^3 - 15t^2 - 15t = 0$, $t(t^2 - 15t - 15) = 0$

da cui:

$t = 0$, $t^2 - 15t - 15 = 0$: $t = \frac{15 \pm \sqrt{285}}{2}$ da cui:

$$t_1 = \frac{15 - \sqrt{285}}{2} \cong -0.94 \quad e \quad t_2 = \frac{15 + \sqrt{285}}{2} \cong 15.94$$

Segno della funzione:

$s > 0$ se $-\frac{1}{3}t^3 + 5t^2 + 5t > 0 \Rightarrow t^3 - 15t^2 - 15t = 0 < 0$, da cui:

$t(t^2 - 15t - 15) < 0$; studiando il segno dei due fattori otteniamo $s > 0$ se:

$$t < \frac{15 - \sqrt{285}}{2} \quad \text{oppure} \quad 0 < t < \frac{\sqrt{285} + 15}{2}$$

Limiti:

$\lim_{t \rightarrow \mp\infty} \left(-\frac{1}{3}t^3 + 5t^2 + 5t\right) = \pm\infty$ (non esistono asintoti obliqui)

Derivata prima:

$s' = -t^2 + 10t + 5 \geq 0$ se $t^2 - 10t - 5 \leq 0$ se:

$5 - \sqrt{30} \leq t \leq \sqrt{30} + 5$: in tale intervallo la funzione è crescente; inoltre:

$t = 5 - \sqrt{30} \cong -0.48$: punto di minimo relativo


$t = 5 + \sqrt{30} \cong +10.48$: punto di massimo relativo

Derivata seconda:

$s'' = -2t + 10 \geq 0$ se $t \leq 5$ (concavità verso l'alto)

Abbiamo il flesso per $t = 5$, con ordinata $s(5) = 30$


Il grafico della funzione è il seguente (è evidenziata da A a B la parte del grafico che tiene conto della limitazione $0 \leq t \leq 10$):



Studiamo la funzione per $10 < t \leq 30$:

$$s = s(t) = 2t^2 + \frac{5}{3}t$$


Si tratta di una parabola passante per l'origine, con asse di simmetria $t = -\frac{5}{12}$, vertice in: $V = \left(-\frac{5}{12}; -\frac{25}{72}\right)$:



La funzione di equazione:

$$s = s(t) = \begin{cases} -\frac{1}{3}t^3 + 5t^2 + 5t, & \text{se } 0 \leq t \leq 10 \\ 2t^2 + \frac{5}{3}t, & \text{se } 10 < t \leq 30 \end{cases}$$

ha quindi il seguente grafico (tratti continui AB e BC):



La funzione è continua nell'intervallo $0 \leq t \leq 30$ ma non è derivabile nel punto di ascissa $t = 10$; infatti:

in un intorno sinistro di $t = 10$ risulta:

$$s'(t) = D\left(-\frac{1}{3}t^3 + 5t^2 + 5t\right) = -t^2 + 10t + 5 \quad \Rightarrow \quad s'_-(10) = 5$$

In un intorno destro di $t = 10$ risulta:

$$s'(t) = D\left(2t^2 + \frac{5}{3}t\right) = 4t + \frac{5}{3} \quad \Rightarrow \quad s'_+(10) = \frac{125}{3}$$

Essendo $s'_-(10) \neq s'_+(10)$ la funzione non è derivabile per $t = 10$ (in particolare abbiamo un punto angoloso). Ciò equivale a dire che la velocità del meteorite prima dell'urto e dopo l'urto è diversa.

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri