

LICEO DELLA COMUNICAZIONE 2010 SESSIONE SUPPLETIVA
PROBLEMA 2

Data la funzione $f(x) = x\sqrt{1-x^2}$

1)

Si determini il dominio di $f(x)$ e si dica se la funzione è continua e derivabile in ogni punto di esso.

Il **dominio** della funzione è dato da: $1 - x^2 \geq 0 \Rightarrow -1 \leq x \leq 1$

La funzione è continua in ogni punto del dominio (prodotto di funzioni continue).

Studiamo la derivabilità:

$$f'(x) = \sqrt{1-x^2} + x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-x^2-x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$$

La funzione non è derivabile in $x = \pm 1$, in cui tangente verticale.

2)

Si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .

$$f(x) = x\sqrt{1-x^2}$$

Domínio: $-1 \leq x \leq 1$

Simmetrie notevoli:

$f(-x) = -f(x)$: quindi la funzione è dispari (grafico simmetrico rispetto all'origine).

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, $y = 0$.

Se $y = 0$, $x = 0$ e $x = \pm 1$.

Segno della funzione:

$$y > 0 \text{ se } 0 < x < 1$$

Limiti:

La funzione è continua in un intervallo chiuso e limitato, quindi non serve lo studio dei limiti. Troviamo i valori agli estremi:

$$f(-1) = f(1) = 0$$

Derivata prima:

$f'(x) = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}} \geq 0$ se $1 - 2x^2 \geq 0$, $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$: in tale intervallo la funzione è crescente.

$x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ è punto di minimo relativo (e assoluto), ed è $f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{1}{2}$

$x = +\frac{\sqrt{2}}{2}$ è punto di massimo relativo (e assoluto), ed è $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}$


Derivata seconda:

$$f''(x) = D\left(\frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}\right) = \frac{2x^3-3x}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}} \geq 0 \text{ se } 2x^3 - 3x \geq 0, \quad x(2x^2 - 3) \geq 0 \Rightarrow x \leq 0$$

Quindi il grafico volge la concavità verso l'alto se $0 < x < 1$ e verso il basso se $0 < x < 1$.


$x = 0$ è un punto di flesso (ordinata $f(0) = 0$).

Il grafico della funzione è il seguente:



3)

Si calcoli l'area della parte di piano R racchiusa dal grafico γ e dal semiasse positivo delle ascisse.




L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$A(R) = \int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \cdot \int_0^1 -2x(1-x^2)^{\frac{1}{2}} dx = -\frac{1}{2} \cdot \left[\frac{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = -\frac{1}{3} [0 - (1)] = \frac{1}{3} \quad u^2 \cong 0.33 \quad u^2 = A(R)$$

4)

La regione R genera, nella rotazione attorno all'asse delle ascisse, un solido S . In S si inscriva un cono circolare retto con vertice nell'origine. Si determinino raggio e altezza del cono, affinché il suo volume sia massimo.



Il volume del cono è: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, dove $r = AH = f(x)$ e $h = OH = x$ (con $0 \leq x \leq 1$)
Quindi:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot f^2(x) \cdot x = \frac{1}{3}\pi \cdot x^2 \cdot (1 - x^2) \cdot x = \frac{1}{3}\pi \cdot x^3 \cdot (1 - x^2) \quad \text{che è massimo se}$$

$$\text{lo è: } y = g(x) = x^3 \cdot (1 - x^2) = x^3 - x^5, \quad \text{con } 0 \leq x \leq 1.$$

Questa funzione è continua e derivabile nell'intervallo chiuso e limitato $[0; 1]$, quindi per il teorema di Weierstrass ammette massimo e minimo assoluti, che sono da ricercarsi tra i valori agli estremi dell'intervallo ed il valori che annullano la derivata prima.

$$g'(x) = 3x^2 - 5x^4 = 0 \quad \text{se } x = 0 \quad \text{e } x = \pm\sqrt{\frac{3}{5}}. \text{ Risulta:}$$

$$g(0) = 0, \quad g\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) = \frac{3}{5}\sqrt{\frac{3}{5}}\left(1 - \frac{3}{5}\right) = \frac{6}{25} \cdot \sqrt{\frac{3}{5}}.$$

Quindi il volume risulta massimo se $x = \sqrt{\frac{3}{5}}$, in tal caso si ha:

$$r = AH = f(x) = f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) = \sqrt{\frac{3}{5}} \cdot \sqrt{1 - \frac{3}{5}} = \frac{1}{5}\sqrt{6} = r \cong 0.49$$

$$h = OH = x = \sqrt{\frac{3}{5}} = h \cong 0.78$$